9. Klasse TOP 10 Grundwissen | 9
sin, cos, tan im rechtwinkligen Dreieck | 08

Sinus, Kosinus am Einheitskreis (= Kreis mit Radius $r = 1$)



$\cos\varphi = x$, $\sin\varphi = y$

Insbesondere ergibt sich also z. B.

- für $\varphi = 30°$ ein „halbes“ gleichseitiges Dreieck mit $x = \frac{1}{2}\sqrt{3}$, $y = \frac{1}{2}$,
- für $\varphi = 45°$ ein gleichschenkliges Dreieck („halbes Quadrat“) mit $x = \frac{1}{2}\sqrt{2}$, $y = \frac{1}{2}\sqrt{2}$.

Beispiel:
Für den Punkt mit $r = 1$, $\varphi = 60°$ („Polarkoordinaten“) erhält man $x = \cos 60° = \frac{1}{2} = 0{,}5$, $y = \sin 60° = \frac{1}{2}\sqrt{3} \approx 0{,}87$ („kartesische Koordinaten“)

Tangens, Kotangens
$\tan\varphi = \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi}$, $\cot\varphi = \frac{\cos\varphi}{\sin\varphi} = \frac{1}{\tan\varphi}$

Trigonometrischer Pythagoras
Wegen $x^2 + y^2 = 1$ ist $(\sin\varphi)^2 + (\cos\varphi)^2 = 1$, Kurzschreibweise: $\sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1$.

Weitere Formeln
(z. B. $\sin(90° - \varphi) = \cos(\varphi)$ und Additionstheoreme) siehe Formelsammlungen.

sin, cos, tan am rechtwinkligen Dreieck



Denkt man sich das nebenstehende Dreieck mit dem Faktor $\frac{1}{r}$ gestreckt (bzw. gestaucht), so erhält man eines mit Hypotenuse 1, Ankathete $\frac{a}{r}$ und Gegenkathete $\frac{b}{r}$ und kann obige Erklärung von sin und cos am Einheitskreis anwenden:

$$\cos\varphi = \frac{a}{r} = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}, \quad \sin\varphi = \frac{b}{r} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}},$$

$$\tan\varphi = \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = \frac{\frac{b}{r}}{\frac{a}{r}} = \frac{b}{a} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$

Beispiele:

1. Gegeben: $\alpha = 50°$, $b = 2$



Hier ist b die Ankathete von α, a die Gegenkathete.
$\cos\alpha = \frac{b}{c} \Rightarrow c = \frac{b}{\cos\alpha} = \frac{2}{\cos 50°} \approx 3{,}1$
$\sin\alpha = \frac{a}{c} \Rightarrow a = c\sin\alpha \approx 2{,}4$ (oder Pythagoras!)
(Taschenrechner [TR] auf DEGREE, siehe TR-Bedienungsanleitung, oft z. B. mit Tasten MODE 4 oder durch wiederholtes Drücken einer DRG-Taste; im TR-Display wird dies meist durch DEG angezeigt [oder D oder nichts, aber **nicht** RAD oder GRAD!])

2. Seilbahn Burgstall (270 m) – Vöran (1200 m), horizontale Entfernung 3,7 cm auf der Karte im Maßstab 1:50 000.



$h = 1200\text{ m} - 270\text{ m} = 930\text{ m}$,
$k = 0{,}037\text{ m} \cdot 50\,000 = 1850\text{ m}$.
$\tan\varphi = \frac{h}{k} = \frac{930}{1850} \approx 0{,}503$.
Je nach Taschenrechner ermittelt man meist mit den Tasten (SHIFT) $\tan^{-1}$ vor oder nach Eingabe des Wertes $0{,}503$ den Winkel:
$\varphi \approx 26{,}7°$.