



<b>9. Klasse Lösungen</b>	<b>9</b>
<b>Quadratische Gleichungen</b>	<b>03</b>

- (a)  $x_{1/2} = 2,5 \pm \sqrt{6,25 - 6} = 2,5 \pm 0,5; x_1 = 2, x_2 = 3$

(b)  $x^2 - 6x - 27 = 0; x_{1/2} = 3 \pm \sqrt{9 + 27} = 3 \pm 6; x_1 = -3, x_2 = 9$

(c)  $x_{1/2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 - 0,3} = 0,5 \pm \sqrt{-0,05};$  keine Lösung

(d)  $x_{1/2} = -2 \pm \sqrt{4 + 7} = -2 \pm \sqrt{11}$

(e)  $x_{1/2} = -6 \pm \sqrt{36 - 36} = -6$  (eine doppelte Lösung)

(f)  $x_{1/2} = \frac{11,7 \pm \sqrt{11,7^2 - 4 \cdot 3 \cdot 4,2}}{2 \cdot 3} = \frac{11,7 \pm 9,3}{6}; x_1 = 0,4, x_2 = 3,5$

(g)  $60x^2 + 57x - 18 = 0; x_{1/2} = \frac{-57 \pm \sqrt{57^2 + 4 \cdot 60 \cdot 18}}{2 \cdot 60} = \frac{-57 \pm 87}{120}; x_1 = -1,2; x_2 = 0,25$

(h)  $x_{1/2} = \frac{-66 \pm \sqrt{66^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-1089)}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-66 \pm 0}{-2} = 33$  (eine doppelte Lösung).

(i)  $-0,5x^2 - 2x + 7 = 0; x_{1/2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot (-0,5) \cdot 7}}{2 \cdot (-0,5)} = \frac{2 \pm \sqrt{18}}{-1} = -2 \mp 3\sqrt{2}$

(j)  $x_{1/2} = \frac{+k \pm \sqrt{(-k)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-k^2)}}{2 \cdot 2} = \frac{k \pm \sqrt{9k^2}}{4} = \frac{k \pm 3k}{4}; x_1 = k, x_2 = -\frac{k}{2}$
- (a)  $8(x^2 - x - 7x + 7) = 15; 8x^2 - 64x + 41 = 0;$   
 $D = (-64)^2 - 4 \cdot 8 \cdot 41 = 2784 > 0;$  also 2 Lösungen

(b)  $-(x^2 - x - 7x + 7) = 15; -x^2 + 8x - 22 = 0;$   
 $D = 8^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-22) = -24 < 0;$  also keine Lösung

(c)  $x^2 - 14x + 49 - (x^2 - 2x + 1) = 15; -12x + 33 = 0;$   
lineare Gleichung mit 1 Lösung (nämlich  $\frac{33}{12} = \frac{11}{4}$ )

(d)  $3(x^2 - 20x + 100) + 8100 = x^2 - 137x - 23x + 3151 + 3999; 2x^2 + 100x + 1250 = 0;$   
 $D = 100^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1250 = 0;$  also 1 doppelte Lösung
3. Bei (a) und (c) muss ausmultipliziert werden. Bei (a) ergibt sich dann  $x_{1/2} = 12 \pm 15,$  bei (c)  $x_{1/2} = -1.$

Bei (b) sollte man nicht ausmultiplizieren; denn ein Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist, also wenn  $x - 7 = 0$  oder  $x - 17 = 0;$  Lösungen somit  $x_1 = 7, x_2 = 17.$

Bei (d) sieht man sofort, dass die Gleichung keine Lösung hat, da ein Quadrat stets  $\geq 0$  ist.
4. Die Zahlen seien  $x$  und  $y.$  Das Gleichungssystem  $x + y = 10, x \cdot y = 11$  löst man, indem man die erste Gleichung nach  $y$  auflöst ( $y = 10 - x$ ) und in die zweite einsetzt:  
 $x(10 - x) = 11; 10x - x^2 = 11; x^2 - 10x + 11 = 0; x_{1/2} = 5 \pm \sqrt{25 - 11} = 5 \pm \sqrt{14}.$   
Ist  $x = 5 + \sqrt{14},$  so ist  $y = 10 - x = 5 - \sqrt{14},$  und umgekehrt.
5. Richtiger Weg: Alles auf eine Seite bringen,  $x$  ausklammern:  
 $x^2 - 49x = 0; x(x - 49) = 0; x_1 = 0, x_2 = 49.$

Im gegebenen falschen Rechenweg fehlte also die erste Lösung  $x_1 = 0.$

Ursache: Man dividiere nie durch einen Ausdruck mit der Lösungsvariablen. Denn da man den Wert von  $x$  noch nicht kennt, könnte es sein, dass man verbotenerweise durch 0 dividiert.
6.  $3x^2 + 30x + 72 = 0$  hat die Lösungen  $x_{1/2} = \frac{-30 \pm \sqrt{900 - 4 \cdot 3 \cdot 72}}{2 \cdot 3} = \frac{-30 \pm 6}{6}; x_1 = -4,$   
 $x_2 = -6.$  Also  $3x^2 + 30x + 72 = 3(x + 4)(x + 6).$